

「エストラジオール(E₂)」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目の委託先より現行試薬の販売中止に伴い、急遽検査内容を変更する旨の連絡がございましたので、取り急ぎお知らせいたします。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

| 頁 | 項目 コード | 検査項目名 | 変更内容 | 新 | 旧 | |
|----|-----------|-------------------------------|---------|----------------------|----------------------|--|
| 42 | 2243 | エストラジオール (E ₂) | 検 体 量 | 血清 0.5 mL | 血清 0.4 mL | |
| | | | 検 査 方 法 | CLIA | ECLIA | |
| | | | 基 準 値 | 裏面の別表をご参照下さい | | |
| | | | 報 告 範 囲 | 10未満、 10～99900000 | 10以下、 11～99900000 | |

※その他検査要領に変更はございません。
※新旧二法の相関につきましては、裏面をご参照下さい。

■変更期日

●2015年8月6日(木)受付分より

以上

■エストラジオール(E₂)基準値


【新法】 (単位:pg/mL)

| | | | | | |
|-----|----|------|------|---|-------|
| 非妊婦 | 女性 | 卵胞期 | 22 | ～ | 147 |
| | | 排卵期 | 57 | ～ | 509 |
| | | 黄体中期 | 56 | ～ | 321 |
| | | 月経期 | 7 | ～ | 153 |
| | | 閉経後 | 6 | ～ | 37 |
| 男性 | | | 10 | ～ | 40 |
| 妊婦 | | 妊娠初期 | 1130 | ～ | 29200 |
| | | 妊娠中期 | 1110 | ～ | 39700 |
| | | 妊娠後期 | 1760 | ～ | 41600 |

【旧法】 (単位:pg/mL)

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-------|------|-------|-----|
| 非妊婦 | 女性 | 卵胞期 | 前期 | 20 | ～ | 85 |
| | | | 後期 | 25 | ～ | 350 |
| | | 排卵期 | | 50 | ～ | 550 |
| | | 黄体期 | | 45 | ～ | 300 |
| | | 閉経後 | | 21以下 | | |
| | | 男性 | | 15 | ～ | 35 |
| 妊婦 | | 10週未満 | 600 | ～ | 3600 | |
| | | 10～15週 | 800 | ～ | 5500 | |
| | | 16～20週 | 3200 | ～ | 20000 | |
| | | 21～25週 | 8900 | ～ | 27000 | |
| | | 26週～30週 | 7900 | ～ | 35000 | |
| | | 31週 | 11000 | ～ | 49000 | |

■新旧二法の相関



(SRL 検討データ)

■参考文献

岩佐 武:産婦と婦人科 73(1):133～140,2006.